

登園届

(医師用)

意見書	
保育園施設長殿	
園児氏名 _____	
病名「 _____ 」	
年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので 登園可能と判断します。	
_____ 年 月 日	
医療機関 _____	
医師名 _____ 印	

保育園では乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行を出来るだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。感染症のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育園生活が可能な状態となってから登園であるようご配慮ください。

○ 医師が記入した意見書が望ましい感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹（はしか）	発症1日前から発疹出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	症状がある期間（発症前24時間～発病後3日程度まで最も感染力が強い）	発症した後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで
風しん	発しん出現の前7日から後7日間くらい	発しんが消失してから
水痘（水ぼうそう）	発しん1～2日前から痂皮形成まで	すべての発しんが痂皮化してから
流行性耳下腺炎	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで
結核		医師が感染の恐れがないと認めるまで
咽頭結膜熱（プール熱）	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いいため結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染 （O157、O26、O111等）		症状が治まり、抗菌薬による治療が終了し48時間をあけて連続2回の検便で菌陰性確認
急性出血結膜炎	ウイルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数か月排出される	医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師が感染の恐れがないと認めるまで